

Bidrag till kännedomen om Amerikas Chrysomeliner.

— Herr BOHEMAN inlemnade en af Doctor C. STÅL författad uppsats under förestående titel:

DORYPHORA. ILLIG.

1. *D. Linnéi*. — Æneo-nigra; thorace longitudine duplo latiore, disco sat dense, subtiliter, latera versus fortius parciusque punctato; elytris flavescens, utriusque seriebus 10 macularum violaceo-nigrarum, limbo immaculato. Long. 22, Lat. 16 Millim. — Brasilia.
2. *D. Paykulli*. — Nigro-ænea; thorace elytris dimidio angustiore, longitudine vix duplo latiore, remote punctato, parallelo; elytris pallide flavescens, utriusque seriebus 10 macularum nigro-violacearum, limbo immaculato. Long. 17½, Lat. 12½ Millim. — Mexico.
3. *D. Dalmani*. — Æneo-nigra; thorace elytris fere ½ angustiore, longitudine duplo et dimidio latiore, utrinque rotundato; elytris stramineis, utriusque seriebus 10 macularum nigrarum, limbo immaculato. Long. 17, Lat. 13 Millim. — Brasilia interior.
4. *D. petulans*. — Ovalis, obscure ænea; thorace sat fortiter minus dense punctato; elytris flavis, vage, hic illic subseriatim, valde distincte punctatis, punctis obscure ferrugineo-cinctis, fasciis 2 erosis obscure ferrugineo-æneis, anteriore supra marginem inflexum extus rufescentem continuata, hoc intus ante fasciam nigricante. Long. 14, Lat. 11 Millim. — Costa Rica.
5. *D. inepta*. — Nigra, subobovata; elytris obovatis, stramineis, sutura, fasciis 2, anteriore in utroque elythro ramulum angustum antrorsum emittente, secunda mox extra medium cum macula minore coherentem, parte apicali, nec non marginis inflexi macula anteriore parva apiceque nigris. Long. 10, Lat. 7½ Millim. — Nova Granada.
6. *D. DeGeeri*. — Æneo-nigra; elytris geminato-seriatim punctatis, brunneo-testaceis, margine inflexo flavo-testaceo. Long. 9, Lat. 7 Millim. — Perù.
7. *D. Fairmairei*. — Ovalis, nigra; thorace (lateribus exceptis) elytris brunneis, illo lævi, his subtiliter geminato-seriatim punctatis. Long. 11, Lat. 7½ Millim. — Brasilia.
8. *D. euchalca*. — Ovalis, valde nitida, supra viridi-ænea, subtus cum antennis pedibusque chalybea; elytris subtiliter minus regulariter geminato-seriatim punctatis. Long. 13, Lat. 10 Millim. — Bolivia.
9. *D. amazona*. — Ovalis, flavescens, subtus nigro-fusca; maculis 2 capitis, 6 thoracis, scutello, sutura nec non maculis 20 (8. 8. 4.)

Öfvers. af K. Vet-Akad. Förh., d. 14 September 1859.

- elytrorum femoribusque medio nigris. Long. 11—12, Lat. 8—9 Millim. — Upper Amazon.
10. *D. eusema*. — Subquadrato-ovalis, testacea; thoracis disco latissimo scutelloque obscure æneis; elytris sordide flavescens, geminato-seriatim punctatis, sutura, margine inflexo, limbo nec non utriusque maculis 2 maximis obscure æneis. Long. 9, Lat. 7 Millim.
 11. *D. clavicornis*. — Ovalis, testaceo-flavescens; antennis nigris, articulis apicalibus dilatatis; macula magna discoidali thoracis, obscure ænea; elytris obscure violaceis, irregulariter geminato-seriatim punctatis, vitta intramarginali, posterius limbum ipsum etiam occupante, margineque inflexo posterius sordide flavescens. Long. 9½, Lat. 7 Millim.
 12. *D. fatidica*. — Ovata, obscure ænea, supra dense vage punctata; thorace latera versus densius fortiusque subimpresso-punctato; elytris nigris, utriusque margine inflexo, limbo latiusculo, parte basali oblique terminata, fascia media lata, inæquali, cum limbo haud confluenta, maculaque pone medium ad vittam suturalem sita, ovali, sat magna, sordide flavescens. Long. 11, Lat. 7½ Millim. — Bogotà.
 13. *D. æmula*. — Subovata, testaceo-flava, supra dense vage punctata; maculis 2 distinctis capitis, 2 maximis thoracis nec non elytrorum ferrugineorum vitta suturali partique laterali intra limbum lævem flavescens fusco-æneis. Long. 8, Lat. 5½ Millim. — Upper Amazon.
 14. *D. ventricosa*. — Valde convexa, gibbosa, compressa, dilute testacea; capite thoraceque sat dense, distincte punctatis, illius macula una basali, hujus maculis 2 nigris; elytris dilute flavescens, subolivaceo-indutis, vage punctatis, vittis 5 latiusculis limboque lævibus. Long. 15, Lat. 11½ Millim. — Upper Amazon.
 15. *D. variolaris*. — Ovata, flavo-testacea; antennis nigricantibus; thorace remote distincte punctato; elytris pallide flavescens, vage subacervatim, hic illic subseriatim distincte fusco-punctatis, punctis brunnescente-cinctis, vitta intramarginali lævigata, limbo fuscescente-testaceo. Long. 11, Lat. 8 Millim. — Bahia.
 16. *D. pervicax*. — Ovalis, supra flava, subtus cum pedibus ænescente-nigra; antennis nigris; capite (macula parva flava excepta), maculis 2 triangularibus maximis, pone medium connexis, basilibus thoracis, scutello; sutura tota, maculis circiter 10, una humerali, reliquis in seriebus 3 transversis positae utriusque elytri æneo-nigris. Long. 9½, Lat. 7 Millim. — Brasilia.
 17. *D. rixosa*. — Breviter ovalis, ænescente-nigra; macula capitis, thorace elytrisque testaceo-flavis, illius maculis 2 magnis basin attingentibus, vittaque horum angusta suturali ænescente-nigris. Long. 9 Lat. 7 Millim. — Brasilia.

18. *D. decens*. — Subovata, nigra; macula capitis, lateribus thoracis elytrisque irregulariter geminato-seriatim punctulatis testaceo-flavis. Long. 9, Lat. 6 Millim. — Columbia.
19. *D. mirabilis*. — Ovalis, sordide flavescens; thorace maculis 6 (lateralibus parvis) nigris; elytris valde irregulariter seriatim punctatis, æneis, margine inflexo, macula communi prope apicem nec non utriusque maculis 2 sat magnis prope suturam maculisque 4 marginalibus flavis. Long. 11, Lat. 8 Millim. — Mexico.
20. *D. impar*. — Subovalis, ænea; antennis, pedibusque testaceis, his æneo-micantibus; elytris flavescentibus, geminato-seriatim punctatis, vitta suturali nec non utriusque maculis circiter 10, plurimis oblongis, magnis, æneis. Long. 11, Lat. 8 Millim. — Mexico.
21. *D. Deyrollei*. — Oblonga, sordide flavescens; maculis parvis 4 capitis, 4 thoracis, scutello, antennis, pectoris lateribus pedibusque nigris; elytris seriatim punctatis. Long. 8, Lat. 5 Millim.
22. *D. carnosa*. — Subsemiglobosa, supra olivaceo-virescens, subtus cum pedibus, antennis, ore, scutelloque flavescente-testacea; elytris striato-punctatis, interstitiis alternis flavescentibus; scutello punctato. Long. 11, Lat. 8½ Millim. — Brasilia.
23. *D. discrepans*. — Ovalis, nigro-ænea, chalybeo-induta; capite thoraceque sat dense distincte punctulatis; elytris obscure violaceis, vage, dorso distinctius, latera versus obsolete punctulatis, versus suturam punctis distinctioribus seriatis etiam instructis. Long. 13, Lat. 9 Millim. — Upper Amazon.
24. *D. æriferæ*. — Ovata, obscure ænea; thorace valde parce punctulato; elytris obscurius viridi-æneis, seriatim distincte punctatis, punctis subtilioribus raris interspersis. Long. 11½, Lat. 8 Millim. Upper Amazon.
25. *D. Bonvouloiri*. — Ovalis, viridi-ænea; thorace elytrisque vage, sat dense, distincte punctulatis, his etiam seriebus punctorum nonnihil distinctiorum instructis, vitta intramarginali obsoleta aurea, margine inflexo subviolaceo. Long. 13—15, Lat. 9—10½ Millim. — Rio Janciro.
26. *D. euopta*. — Ovalis, obscure violacea, thorace ubique sat fortiter punctato; scutello elytrisque viridi-æneis, his vage distincte punctatis, seriebus nonnullis geminis dorsalibus punctorum subfortiorum instructis, parte laterali interstitiisque dorsalibus (licet obsolete) purpureo-aureis. Long. 15, Lat. 11 Millim. — Brasilia.
27. *D. chalcoloma*. — Subovata, ænea; antennis pedibusque obscure testaceis; angulis anticis thoracis elytrisque sordide flavescentibus, his irregulariter subacervato-seriatim punctatis, margine inflexo, limbo vittaque suturali æneis. Long. 10, Lat. 7½ Millim. — Brasilia.

28. *D. Salléi*. — Ovata, ænea, antennis pedibusque testaceis, femoribus medio æneis; elytris sordide stramineis, valde irregulariter subgeminato-seriatim punctulatis, sutura, margine inflexo, limbo nec non utriusque vittis 4 interruptis fusco-æneis. Long. 9, Lat. 7 Millim. — Mexico.
29. *D. signifrons*. — Ovalis, viridi-ænea, subtus obscurior; macula basali capitis flavo-testacea; thorace parvo, antrorsum angustato, subremote, latera versus quam disco fortius punctato; elytris aciculatis, vage distincte punctulatis. Long. 13, Lat. 9½ Millim. — Bolivia.
30. *D. 12-signata*. — Ovalis, flavo-testacea, elytris obscurioribus, geminato-seriatim punctatis, utriusque maculis 6 (2. 2. 2) testaceo-flavescentibus, 4 anterioribus ovalibus, 2 posticis elongatis. Long. 13, Lat. 9 Millim. — Brasilia.
31. *D. consors*. — Testaceo-flavescens, thorace remote distincte punctato; elytris striato-punctatis, maculis 10 (4. 4. 2) minoribus nigris. Long. 12, Lat. 8 Millim. — Brasilia.
32. *D. atricollis*. — Oblonga, nigra; elytris striato-punctatis, testaceis, sutura nigra. Long. 10, Lat. 6 Millim. — Brasilia.
33. *D. excellens*. — Ovalis, rufo-testacea; thorace remote punctato; elytris subtiliter geminato-seriatim punctatis, vitta angusta suturali, limbo, margini inflexo extus, nec non utriusque maculis 11, 2 basalibus (una humerali), 3 nonnihil ante medium, 4 nonnihil pone medium, 2 minoribus approximatis posterioribus viridi-æneis. Long. 15, Lat. 10½ Millim. — Amazon.
34. *D. discoptera*. — Ovalis, nigro-ænea; thorace parce punctato; elytris dense, vage, dorso geminato-seriatim punctatis, dilute flavescentibus, vitta angusta suturali nec non disco quam maximo communi, maculis 2 flavis ornato, nigris. Long. 9—11, Lat. 6—7½ Millim. — Nova Granada.
35. *D. alumna*. — Ovalis, ænescens, testaceo-pellucens; thorace lato, parce, distincte punctulato; elytris testaceo-flavescentibus, margine inflexo, limbo, vitta suturali angusta, basi dilatata, nec non utriusque maculis 2 minoribus fusco-æneis. Long. 10, Lat. 7 Millim. — Perù.
36. *D. biguttata*. — Ovalis, æneo-nigra; thorace parum punctato; elytris stramineis, irregulariter geminato-seriatim fusco-punctatis, margine inflexo, limbo, vitta suturali, nec non utriusque fascia arcuata obliqua anteriore maculaque fere media æneo-nigris. Long. 13, Lat. 9 Millim. — Parà.
37. *D. subnotata*. — Subovata, nigro-ænea; thorace dense sat fortiter punctato; elytris testaceo-flavis, vage, dorso geminato-seriatim punctatis, vitta suturali basali nec non maculis utriusque 4 (2. 2), fusco-brunneis, anteriore seriei primæ antrorsum elongata. Long. 10, Lat. 7 Millim. — Nova Granada.

38. *D. suturata*. — Subovata, dilute testaceo-flavescens; thorace sat dense fortiterque punctato; elytris purius flavescentibus, vage, dorso geminato-seriatim punctatis, limbo, margine inflexo, extus, vitta suturali nec non utriusque maculis 2 magnis æneis. Long. 10, Lat. 7 Millim. — Columbia.
39. *D. æneo-notata*. — Subovata, æneo-nigra; capite thoraceque sat dense fortiterque punctatis; elytris flavo-testaceis, vage, dorso geminato-seriatim punctatis, vitta suturali maculisque pluribus ex parte confluentibus obscure æneis. Long. 11½, Lat. 8 Millim. — Nova Granada.
40. *D. Lafertéi*. — Ovalis, obscure ænea; thorace parce punctato; elytris pallide flavescentibus, geminato-seriatim punctatis, vitta angusta suturali ænea, utriusque maculis 5 (2. 2. 1) obsoletis, parvis, brunnescentibus. — Long. 10, Lat. 7 Millim. — Nova Granada.
41. *D. micans*. — Ovata, supra viridi-ænea, valde nitida, subtus cum pedibus antennisque viridi-chalybea; thorace parce, distincte punctato, elytris subcupreo-micantibus, sat regulariter et distincte seriatim punctatis, punctulis vagis interspersis. Long. 10½, Lat. 8 Millim. — Chiquitos.
42. *D. Falléni*. — Ovata, gibbosa, nigro-ænea, fusco-brunneo-pellucens, geniculis tarsisque dilutioribus; thorace sat dense, fortiter, utrimque impresso-punctato; elytris geminato-seriatim punctatis, utriusque vitta intra-marginali, ante medium interrupta, macula subbasali prope scutellum nec non fascia abbreviata et interrupta media flavescentibus. Long. 11, Lat. 8 Millim. — Mexico.
43. *D. gemine-punctata*. — Ovalis, straminea, subtus nigro-ænea; pedibus testaceis, æneo-indutis; antennis nigricantibus, basi testaceis; thorace minus dense acervatim, elytris geminato-seriatim, fusco-æneo vel fusco-ferrugineo-punctatis. Long. 12, Lat. 8 Millim. — Nova Granada.
44. *D. difficilis*. — Ovalis, fusco-cuprescens; elytris flavescentibus, vitta angusta suturali limboque obscure æneis, utriusque maculis 15 (3. 4. 4. 4.) brunneo-testaceis, saepe anguste æneo-cinctis. Long. 12, Lat. 9½ Millim. — Brasilia.
45. *D. florigera*. — Ovalis, dilute lutescens; maculis 2 basalibus capitis, maculis 2 thoracis, scutello, maculis 10 (4. 4. 2.) elytrorum, lateribus pectoris ventreque (segmento apicali excepto) obscure chalybeis. Long. 10, Lat. 7 Millim. — Perù (?).
46. *D. verecunda*. — Ovalis, chalybeo-ænea; macula basali capitis, angulis ipsis thoracis elytrisque testaceo-flavescentibus, his acervatim, prope suturam seriatim punctatis, parce æneo-sparsis. Long. 11½, Lat. 8 Millim. — Santa Catharina Brasiliæ.
47. *D. maculifrons*. — Nigro-chalybea; macula capitis elytrisque luteis, his irregulariter subgeminato-seriatim punctatis, margine in-

flexo, limbo, vitta valde angusta suturali, maculisque utriusque 3 anterioribus nigro-chalybeis. Long. 13, Lat. 9. Millim. — Bolivia.

48. *D. comica*. — Nigro-ænea; thorace parce impresso-punctato; clytris obovatis, remote, valde irregulariter geminato-seriatim fortiter punctatis, utriusque maculis 3 basalibus, 2 majoribus posticis, fasciisque undatis 2 mediis nec non margine inflexo flavis, hujus macula ante medium parteque apicali nigris. Long. 17, Lat. 13 Millim. — Cayenna.

DEUTEROCAMPTA. ER.

I. Prosterno longitrorsum valde elevato, meso- et metasternis subæqualto; antennarum articulis 6 ultimis clavam plus minus distinctam formantibus, elytris seriatim punctatis.

1. *D. rubro-ænea*. — Ænea; thorace sat fortiter, remote punctato; elytris rubris, interdum obsolete æneo-micantibus, valde fortiter punctatis. Long. 10½, Lat. 7 Millim. — Brasilia.
2. *D. fimbriata*. — Ænea, remote distincte punctata; elytris sat fortiter punctatis, rubris, limbo margineque inflexo dilute testaceo-flavescentibus. Long. 10, Lat. 7 Millim. — Brasilia.
3. *D. Westringi*. — Viridi-ænea, thorace parce punctulato; elytris fortiter punctatis, testaceo-flavis. Long. 9¼, Lat. 6½ Millim. — Brasilia.
4. *D. Schaumi*. — Ænea, remote distincte punctata; antennis, tarsis elytrisque ferrugineo-brunneis, his sat fortiter punctatis, utriusque maculis 2 basalibus et una apicali dilute sordide flavescentibus. Long. 11, Lat. 7 Millim. — Brasilia.
5. *D. quadri-fenestrata*. — Obscure rufo-testacea, remote distincte punctata, subtus ænea vel æneo-micans; elytris valde distincte punctatis, dilute flavescentibus, vitta suturali communi nec non utriusque fascia mox ante medium, a medio vittam antrorsum emittente, margineque inflexo pone medium nigricantibus. Long. 11, Lat. 7 Millim. — Brasilia.
6. *D. obliqua*. — Ænea, parce, minus distincte punctata; elytris pallide sordide flavescentibus, sat fortiter æneo-punctatis, margine inflexo limboque omni purius flavescentibus, sutura nec non utriusque fasciis 2, una anteriore, altera media obliqua, cum sutura cohærentibus, extus abbreviatis, æneis. Long. 11, Lat. 7 Millim.
7. *D. brachiata*. — Ænea, remote, distincte punctata; elytris subtilius punctatis, flavis, vitta communi antierius angustata, nec non utriusque macula basali ad humerum, fascia nonnihil ante medium extus angustata, fasciola arcuata pone medium cum vitta suturali cohærente, macula marginali pone medium aliaque prope

apicem cum sutura confluyente nigris. Long. $10\frac{1}{2}$, Lat. 7 Millim.
— Brasilia.

8. *D. lauticornis*. — Æneo-nigra, remote punctulata; antennis testaceis; elytris sordide flavescens, vitta suturali communi nec non utriusque limbo angusto basali prope humerum ampliato, fascia nonnihil ante medium, macula marginali pone medium introrsum et retrorsum anguste producta et ad suturam lineam emittente nec non margine inflexo pone medium nigris. Long. 11, Lat. 8 Millim. — Brasilia.
9. *D. Sahlbergi*. — Æneo-nigra, parce punctata; antennis tarsisque testaceis, thoracis parte anteriore, elytris sordide pallide flavescens, horum vitta suturali communi nec non utriusque fascia anteriore, extrorsum angustata, fascia posteriore angusta, extus valde dilatata margineque inflexo pone medium nigris. Long. $10\frac{1}{2}$, Lat. 7 Millim. — Rio Janeiro.
10. *D. stulta*. — Supra flavescens, subtus cum capite scutelloque æneo-nigra; antennis tarsisque testaceis; thorace plaga magna, magnitudine et latitudine variabili, æneo-nigra; elytris distincte punctatis, vitta suturali nec non utriusque margine angusto basali extus dilatato, fasciaque mox ante medium extus abbreviata, nigris. Long. 10—12, Lat. 7— $8\frac{1}{2}$ Millim. — Brasilia.

var. b. — elytris ante fasciam lineis abbreviatis cum fascia confluentibus, pone fasciam lineis longitudinalibus nec fasciam nec apicem attingentibus nigris ornatis.

11. *D. partita*. — Nigro-ænea, remote punctata; antennis, geniculis, tibiis tarsisque ferrugineis; prothorace elytris sordide flavescens, illius maculis 3 magnis quadratis basalibus æneo-nigris, his distincte punctatis, seriebus punctorum nigro-lineatis, lineis medio interruptis, fascia angusta mox ante medium sita, utriusque abbreviata utrinque nigra. Long. 11, Lat. 7 Millim. — Brasilia.

II. Corpore ovali vel oblongo-ovali; thorace ultra medium parallelo, remote, distincte punctato; elytris subgeminato-seriatim vel minus regulariter seriatim distincte punctatis; prosterno minus elevato; antennis apicem versus subsensim incrassatis.

12. *D. recurrens*. — Obscure ænea; elytris minus regulariter seriatim punctatis, utriusque vitta intra-marginali basi introrsum flexa et ad scutellum ducta, prope apicem abbreviata et ibidem cum vitula suturæ approximata confluyente nec non fascia media, utriusque abbreviata sordide flavescens. Long. $10\frac{1}{2}$, Lat. $7\frac{2}{3}$ Millim. — Bahia.
13. *D. plagiata*. — Obscure ænea; elytris sordide flavescens, minus regulariter seriatim punctatis, limbo, vitta suturali apice dilatata, margine inflexo plagisque 2 transversis erosis, magnis, æneo-nigris. Long. $11\frac{1}{2}$, Lat. 8 Millim.

14. *D. nigro-zonata*. — Subaenescenti-nigra; antennis, palpis, tibiis tarsisque testaceis; elytris sordide flavescentibus, vitta suturali angusta apice valde dilatata fasciisque 2 latis nigris. Long. 10, Lat. 7 Millim. — Brasilia.
 15. *D. maculigera*, STÅL.
 16. *D. venustissima*, PERTY.
- III. Corpore ovali; antennis articulis 5 ultimis leviter compressis, latioribus, clavam plus minus distinctam formantibus; thorace a medio antrorsum angustato, punctato, versus angulos anticos laevi; elytris regulariter seriatim punctulatis; prosterno nonnihil elevato, posterius carinato.
17. *D. ducalis*. STÅL.
 18. *D. semistriata*. FABR.
 19. *D. stauroptera*. GERM.
 20. *D. Crux nigra*. — Nigricans; antennis, palpis pedibusque testaceis; thoracis lateribus (basi excepta) elytrisque stramineis, vitta suturali, fascia fere media marginisque inflexi limbo interno parteque dimidia postica nigris. Long. 11½, Lat. 8 Millim. — Brasilia.
 21. *D. sedula*. — Supra straminea, subtus cum capite, maculis 2 magnis approximatis, puncto posteriore inter maculas margineque angusto basali thoracis, scutello, elytrorum sutura ipsa, linea transversa media marginisque inflexi limbo interiore et parte dimidia postica femoribusque nigra; antennis, tibiis tarsisque testaceis. Long. 11—13, Lat. 7—8½ Millim. — Brasilia.
 22. *D. pustulicollis*. — Supra straminea, subtus cum capite, maculis 2, puncto posteriore inter maculas limboque angusto basali thoracis, scutello, elytrorum sutura, linea transversa media, lineis longitudinalibus medio interruptis series punctorum occupantibus nec non marginis inflexi parte dimidia postica et limbo interno femoribusque nigra; antennis, tibiis tarsisque nigris. Long. 10—11½, Lat. 7—8 Millim. — Brasilia.
 23. *D. impictipennis*. — Supra straminea, subtus cum capite, limbo angusto basali maculisque 2 sat magnis thoracis, basin attingentibus, scutello, sutura ipsa marginisque elytrorum inflexi basi et parte dimidia postica nigra; antennis palpisque flavo-testaceis; pedibus testaceis. Long. 11—12½, Lat. 7—7½ Millim.
 24. *D. vigilans*. — Obscure brunneo-testacea, macula utrinque antica thoracis pallide flavescente; elytris eburneis, vitta angusta inaequali suturali, fascia fere media seriebusque 2 transversis macularum, una ante, altera pone fasciam, basi parteque dimidia postica marginis inflexi elytrorum nigris. Long. 10, Lat. 7 Millim. — Rio Janeiro.
 25. *D. vinculata*. GERM.

26. *D. sava*. — Nigra, fasciis 3 utriusque elytri stramineis, basali abbreviata, reliquis 2 supra marginem inflexum continuatis, extus cum macula apicali maculaque utrinque magna laterali thoracis flavis. Long. 9—10, Lat. 6—7 Millim. — Brasilia.
27. *D. leucomelæna*. PERTY.
28. *D. opposita*. — Nigra; thorace flavescente, maculis 2 magnis basalibus, connexis, nigris; elytris stramineis, vitta communi suturali, prope apicem abbreviata, nec non utriusque maculis 4, una oblonga ante medium, una elongata media, suturæ approximata, 2 posterioribus, exteriore cum limbo, interiore cum apice vittæ suturalis conjunctis, nigris. Long. 9—10, Lat. 6 Millim. — Brasilia.

IV. Ovales. Antennarum articulis 5 ultimis clavam plus minus distinctam formantibus; thorace fere a basi antrorsum plus minus angustato, undique vel latera versus punctato; elytris sæpius seriatim punctatis; prosterno haud vel parum elevato, medio (posterius saltem) carinato.

29. *D. Crux*. ER.
30. *D. nigriventris*. GERM.
31. *D. lineatipennis*. — Flavescens, subtus cum clava antennarum, pedibus, macula parva capitis, maculis 8 (4. 4.) thoracis, scutello, sutura lineisque 5 (prima abbreviata) utriusque elytri nigra. Long. 8, Lat. 5 Millim. — Brasilia.
32. *D. nigro-pustulata*. — Flavescens, subtus cum pedibus, antennis apicem versus, maculis 8 (4. 4.) thoracis, lateralibus parvis, maculisque 11 minutis et 4 majoribus elytrorum (una subhumerali, 2 mediis, una prope apicem) nigra. Long. 7—8, Lat. 5—5½ Millim. — Brasilia.
33. *D. nigro-stillata*. — Testaceo-flavescens, subtus cum pedibus, antennis fere totis, maculis 3 (media magna) thoracis, scutello, maculis 3 parvis et 2 magnis elytrorum nigra. Long. 9, lat. 6 Millim.
34. *D. bioculata*. — Testaceo-flavescens, subtus cum pedibus, antennis, maculis 6 elytrorum (4 mediis, 2 prope apicem) nigra, horum macula basali ad scutellum purius flava, nigro-cincta, extus ramulum nigrum emittente. Long. 9, Lat. 6 Millim.
35. *D. flavo-signata*. — Brunneo-testacea; antennis nigris, basin versus flavo-testaceis; maculis 6 utriusque elytri flavis, nigrocinctis. Long. 7½—9½, Lat. 5—6½ Millim. — Brasilia.
36. *D. sex-pustulata*. — Testacea; clava antennarum, pedibus, scutello, maculis 3 utriusque elytri nigris. Long. 8—9, Lat. 6—6½ Millim. — Brasilia.
37. *D. sigillifera*. — Testacea; clava antennarum, tarsisque nigris; utriusque elytri maculis sat magnis 4 marginalibus et una ad scutellum flavis, nigro-cinctis, puncto medio nigro. Long. 8, Lat. 5½ Millim. — Brasilia.

38. *D. privigna*. — *Aenea*; antennis, scutello pedibusque testaceis; elytris flavis, interstitiis alternis æneis, 4 et 6 vittaque suturali testaceis. Long. 8, Lat. 6 Millim. — Brasilia.
39. *D. Kraatzi*. — Testacea, maculis capitis 8 (4. 4.) thorace, sutura, maculis 2 basalibus, vittis 4 mediis et 4 posterioribus nec non vitta abbreviata, longius pone medium interrupta prope suturam utriusque clytri limboque basali segmentorum ventralium nigris. Long. 9, Lat. 6 Millim.
40. *D. 14-pustulata*. — Testacea; antennis apicem versus nigris; elytris maculis 14 (4. 4. 4. 2) pallide flavis ornatis. Long. 7, Lat. 5 Millim. — Cayenna.

V. Ouales; antennarum articulis 6 ultimis clavam formantibus, prosterno impresso vel concaviusculo: elytris seriatim punctatis.

41. *D. mutabilis*. — Testacea, clava antennarum nigra; elytris testaceo-flavis, unicoloribus vel nigro-pictis. Long. $6\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$, Lat. $4\frac{1}{2}$ —6 Millim. — Rio Janeiro.

var. *a*. — elytris impictis.

var. *b*. — elytris interstitiis alternis maculis vittulisque nigris ornatis.

var. *c*. — utroque elytro vittis 4, exteriore interrupta, nigris.

var. *d*. — elytris maculis fasciisque nigris confluentibus.

42. *D. atro-maculata*. — Nigra, lateribus maculaque parva oblonga thoracis anteriore elytrisque flavis, horum vitta angusta suturali fascia utriusque extus abbreviata, inæquali, maculisque 3, 2 exterioribus, una interiore cum sutura saepe coherente nigris. Long. 7, Lat. 5 Millim. — Mexico.

VI. Ouales, antennarum articulis 5 ultimis clavam formantibus; elytris saepius seriatim punctatis; prosterno haud vel vix elevato, sulcato aut postice impresso aut planiusculo; tarsorum articulo apicali simplici.

43. *D. bimaculicollis*. — Ovalis, testaceo-flavescens; antennis (basi excepta), macula capitis, maculis 2 thoracis, scutello, pectoris lateribus late, pedibusque nigris; serie punctorum nona elytrorum irregulari. Long. $7\frac{1}{2}$, Lat. 5 Millim. — Brasilia.

44. *D. nigrimana*. — Ovalis, testaceo-flavescens; clava antennarum, maculis 2 thoracis parvis, scutello, tarsisque nigris; serie punctorum nona elytrorum irregulari. Long. 6, Lat. $4\frac{1}{2}$ Millim. — Brasilia.

45. *D. trimaculicollis*. — Ovalis, testaceo-flavescens, maculis 4 capitis, 3 thoracis, scutello, pectore, serie utrinque laterali macularum ventris pedibusque nigris. Long. $8\frac{1}{2}$, Lat. $5\frac{1}{2}$ Millim. — Brasilia.

46. *D. ochreatea*. — Testacco-flavescentis; clava antennarum, trochanteribus, apice femorum, tibiis tarsisque nigris; elytris latera versus vage punctatis. Long. 9, Lat. 6 Millim. — Brasilia.
47. *D. bis-octoguttata*. — Ovalis, flavo-testacea, clava antennarum nigra; utroque elytro maculis 8 (2. 2. 2. 1. 1) flavescentibus, fusco-cinctis ornato. Long. 7, Lat. 5 Millim. — Rio Janeiro.
48. *D. jocosa*. — Breviter ovalis, ænea, antennis basin versus, tarsisque testaceis; elytris flavis, vel testaceo-flavis, plaga communi suturali scutellum haud attingente, basi lata, medio valde angustata, nec non utriusque maculis 2 sat magnis æneis. Long. 5½, Lat. 4¾ Millim. — Brasilia.
49. *D. 12-maculata*. — Oblongo-ovalis, pallide griseo-flavescentis, antennis (art. 3 basalibus exceptis) nigris; scutello maculisque utriusque elytri 6 (2. 1. 2. 1) æneis. Long. 9, Lat. 5½ Millim. — America merid. interior.

VII. Ouales, antennis apicem versus subsensim incrassatis; elytris seriatim punctatis; prosterno haud vel vix elevato, sulcato vel postice impresso.

50. *D. quadri-plagosa*. — Breviter ovalis, nigra, thorace æneo-induto; elytris subtiliter punctatis, æneis, utriusque maculis 2 magnis, anteriore maxima, transversa luteis. Long. 7—8, Lat. 5½—6 Millim. — Brasilia.
51. *D. sex-maculata*. — Testacea, elytris testacco-flavescentibus, vitta angusta suturali nec non utriusque maculis 3 sat magnis limboque angusto, antice subito latiore, obscure æneis. Long. 8½, Lat. 6 Millim. — Brasilia.
52. *D. rubripennis*. — Ovalis, ænea, elytris rufescente-testaceis, sutura margineque inflexo æneis, hoc violaceo-micanté. Long. 9, Lat. 7 Millim. — San Paolo.
53. *D. nitidipennis*. — Breviter ovalis, obscure chalybea, elytris viridi-æneis. Long. 8, Lat. 6½ Millim. — Brasilia.
54. *D. perspicillaris*. — Ovalis; flavo-testacea; maculis pectoris pedumque, ventre (excepto limbo), antennis fere totis, maculis 6 thoracis, elytris nigris, utriusque horum margine basali, margine suturali anterieus, linea transversa subarcuata ante medium, suturam versus lineam retrorsum emittente, linea transversa posteriore, limbo margineque inflexo flavis, limbo medio æneo. Long. 7½, Lat. 5¾ Millim. — Bahia.

VIII. Ouales, antennarum articulis 5 ultimis clavam formantibus; elytris striato-punctatis; prosterno vix elevato, postice depresso; articulo apicali tarsorum subtus bidentato.

55. *D. musicalis*. — Testacea, subtus ænea; elytris flavescentibus, maculis 3 vel 4 interstitiorum alternorum nigris, sutura vittu-

lisque maculas nigras binas conjungentibus, testaceis. Long. 9, Lat. 6 Millim. — Brasilia.

IX. Subobovatae; antennis gracilibus, apicem versus sensim leviter incrassatis; elytris striato-punctatis; prosterno haud elevato, carinato.

56. *D. 16-maculata*. — Flavescente-testacea, elytris obscurioribus, maculis utriusque subaequimagnis 8 vel 9 (3. 2. 2. 1. 1.) pallidioribus, plus minus distinctis; antennis nigris, basin versus flavo-testaceis. Long. 9, Lat. 6½ Millim. — Surinam.
57. *D. subguttata*. — Testacea, antennis apicem versus nigris; elytris flavo-testaceis, maculis obsolctis ex parte parvis, pallidioribus. Long. 8, Lat. 5½ Millim. — Parà interior.
58. *D. sublineata*. — Flavo-testacea, antennis (parte basali excepta) lineisque 4 utriusque elytri pallidioris nigris. Long. 10, Lat 7 Millim. — Bolivia.
59. *D. Nigricrus*. — Testacea, antennis (basi excepta) tibiis tarsisque nigricantibus. Long. 8½, Lat. 6 Millim.

LEPTINOTARSA. CHEVR.

1. *L. Zetterstedti*. — Brunneo-testacea, elytris dorso acervato-seriatim, latera versus vage punctatis, vitta intra limbum introrsum ramulos 4 abbreviatos emittente, maculisque quaternis vel quinis prope suturam irregularibus flavis, fusco-marginatis. Long. 12, Lat. 8½ Millim. — Mexico.

MYOCORYNA. STÅL.

Corpus ovale vel ovatum, valde convexum, compressum. Antennae crassiusculae vel crassae, articulis 5 apicalibus brevibus vel subtransversis, saepius clavam sat distinctam formantibus. Unguiculi divaricati.

I. Corpus ovale; elytris saepius flavis, aeneo- vel nigro-vittatis, plus minus regulariter seriatim vel acervato-seriatim, raro subvage, distincte vel subfortiter punctatis. — *Polygramma*. CHEVR.)

1. *M. juncta*. GERM.
2. *M. 11-lineata*. — Supra flavescens, subtus cum capite, antennis, margine inflexo elytrorum pedibusque nigra; vittis 2 capitis et interdum macula apicali, flavescens; maculis et signaturis thoracis, scutelloque nigris; elytris acervato-seriatim (raro regularius seriatim) distincte punctatis, sutura, limbo vittisque 4 nigro-aeneis. Long. 9—12, Lat. 6—7 Millim. — Mexico, Bogotà, Costa Rica, Bolivia.
3. *M. multi-lineata*. — Flavescens, macula cordata basique capitis, maculis signaturisque thoracis, limbo scutelli, sutura vittisque 5 (exteriore marginali) elytri utriusque acervato-seriatim punctati,

maculis pectoris, ventris pedumque geniculis tarsisque æneo-nigris. Long. 9, lat. 6 millim. — Mexico.

4. *M. multi-taxiata*. — Ovalis, nigra, supra flava, maculis liturisque majoribus thoracis, limbo scutelli, sutura vittisque 5 (exteriore intramarginali) utriusque elytri nigris, horum margine inflexo a basi ultra medium flavescente. Long. 10, lat. 5½ millim. — Mexico.
5. *M. signaticollis*. — Ovalis, nigra, supra cum vittis 2 capitis flavescens; maculis signaturisque thoracis scutelloque nigris; elytris vage, versus suturam acervato-subseriatim æneo-punctatis, vitta angusta suturali, limbo margineque inflexo obscure æneis. Long. 10—12½, lat. 7—8 millim. — Mexico.
6. *M. defecta*. — Ovalis, dilute flavescens; antennis (art. basalibus exceptis), maculis capitis 2 minoribus intra antennas, unaque media cordata majore, maculis signaturisque thoracis, vitta angusta suturali interstitiisque elytrorum irregulariter seriatim punctatorum tertio posterius, quinto pone medium, septimo fere toto, nec non maculis pectoris, ventris pedumque obscure æneis, vel nigris. Long. 9, lat. 6 millim. — Texas.
7. *M. Melanothorax*. — Nigra, elytris flavis, subacervato-seriatim punctatis, sutura nec non utriusque vittis 5 (exteriore intramarginali) nigris. Long. 10, lat. 6½ millim. — Mexico.
8. *M. Dahlbomi*. — Ovalis, nigro-ænea, elytris sat regulariter seriatim punctatis, interstitiis 2 et 8 totis, nec non 7 (basi excepta) flavis; antennis basin versus, palpis tarsisque rufo-piceis. Long. 7½, lat. 5 millim. — Mexico, Texas.

II. Corpus ovatum, metallicum vel nigrum, raro flavum, subtilius punctatum; elytris plus minus regulariter geminato-seriatim punctulatis. (*Myocoryna*. CHEVR.)

9. *M. rubiginosa*. ROGERS.
10. *M. Haldemanni*. ROGERS.
11. *M. libatrix*. SUFFR.
12. *M. chlorizans*. SUFFR.
13. *M. litigiosa*. SUFFR.
14. *M. violacescens*. — Obscura violacea, nitida, subtus cum pedibus antennisque nigra, his basi flavo-testaceis; thorace convexo, subtiliter punctato. Long. 8½—10, lat. 6—7 millim. — Mexico.

III. Corpus breviter ovale, valde convexum, subhæmisphæricum; articulo ultimo tarsorum apice bidentato. (*Eugonycha* CHEVR.)

15. *M. melanostoma*. — Lutescens, apice mandibularum antennisque apicem versus nigris; thorace sat dense, subtiliter, latera versus nonnihil fortius punctato; elytris vage punctulatis, vittis angustis, lævibus. Long. 9½—11, lat. 8—9 millim. — Brasilia.

ZYGOGRAMMA. ER.

A. Elytris æneis, flavo bi- vel trivittatis.

1. *Z. quadri-lineata*. — Ovalis, obscure ænea, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris chalybeo-æneis, striato-punctatis, interstitiis secundo lato et 2 intra-marginalibus limboque basali flavis. Long. $6\frac{1}{4}$ —8, lat. $4\frac{1}{4}$ —5 millim. — Brasilia.
2. *Z. quinque-vittata*. — Ovalis, obscure ænea, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris striato-punctatis, chalybeo-æneis, interstitiis secundo (tertio latiore), quarto et 2 marginalibus nec non limbo basali flavis. Long. $6\frac{1}{2}$ —8. lat. 4—5 millim. — Brasilia.
3. *Z. sex-vittata*. — Ovalis, obscure ænea, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris striato-punctatis, chalybeo-æneis, interstitiis 2 et 4 (tertio nonnihil angustioribus), 8 et 9 nec non limbo basali flavis. Long. 8, lat. 5 millim. — Brasilia.
4. *Z. connexa*. — Ovalis, obscure ænea, subtus cum pedibus nigra; elytris striato-punctatis, obscure chalybeis, interstitiis 2 et 4 (tertio nonnihil angustioribus), 8 et 9 limboque basali flavis. Long. 7, lat. $4\frac{2}{3}$ millim. — Brasilia.
5. *Z. appendiculata*. — Ovalis, obscure ænea; antennis pedibusque rufo-piceis; elytris chalybeo-æneis, striato-punctatis, limbo basali, interstitiis secundo (tertio latiore), quarto pone medium nec non 2 marginalibus flavis. Long. $6\frac{1}{3}$, lat. 4 millim. — Brasilia.
6. *Z. sex-tvittata*. — Ovalis, obscure ænea, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris nigris, ex parte minus regulariter seriatim punctatis, (seriebus 3 et 4 irregulariter geminatis), limbo basali, interstitiis 2 et 4 angustiusculis nec non 2 marginalibus flavis. Long. 7—8 $\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ —6 millim. — Monte Video.
7. *Z. Aurilinea*. — Ovalis, obscure ænea, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris subchalybeo-nigris, subtilius minus regulariter seriatim punctatis, (seriebus 3 et 4 irregulariter geminatis), limbo basali, interstitiisque 2 et 4, 8 et 9 pallide flavis. Long. 7—8, lat. $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{3}$ millim. — Brasilia.
8. *Z. virgata*. — Ovalis, piceo-nigra, elytris striato-punctatis, limbo angusto basali interstitiisque 2, 8 et 9 flavis. Long. 5—6, lat. 3—4 millim. — Brasilia.
9. *Z. quadri-lorata*. — Breviter ovalis, æneo-nigra, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris striato-punctatis, limbo latiusculo basali interstitiisque 2, 8 et 9 aureo-flavescentibus. Long. 6, lat. $4\frac{1}{3}$ millim. — Brasilia.
10. *Z. tetragramma*. — Ovalis, nigra; elytris striato-punctatis; limbo basali, interstitiis 2 latiusculo nec non 8 et 9 marginibusque lateralibus thoracis flavis. Long. 7, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
11. *Z. hexagramma*. — Ovalis, nigro-picea, elytris nigris, striato-punctatis, limbo angusto basali, interstitiis 2 et 4 (tertio angu-

stioribus), 8 et 9 nec non marginibus lateralibus thoracis flavis. Long. 7, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Nova Granada.

12. *Z. cognata*. — Brevius ovalis, fusco-picea, elytris obscurioribus, limbo basali, interstitiis 2 et 4 (tertio subæquilatis), 8 et 9 nec non marginibus lateralibus thoracis flavis. Long. 5, lat. $3\frac{2}{3}$ millim. — Nova Granada.

B. Elytris flavis, striato-punctatis, utriusque vittis 4 æneis vel nigris, raro testaceis.

13. *Z. novem-teniata*. — Ovalis, ænea, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris subfortiter punctatis, sutura, interstitis 1, 3, 5 (reliquis nonnihil brevioribus) et 7 nec non linea seriei punctorum nonæ æneis. Long. 7— $8\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ —5 millim. — Brasilia.
14. *Z. novem-striata*. — Ovalis, ænea, elytris flavis, sutura, interstitiis 1, 3, 5 (reliquis nonnihil brevioribus) et 7, margine ipso, limboque exteriori et interiore parteque subdimidia apicali marginis inflexi æneo-nigris. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
15. *Z. assimilis*. — Rufo-picea, pectore infuscato; elytris flavis, subtilius punctatis, sutura, interstitiis 1, 3, 5 (reliquis brevioribus) et 7 margineque ipso piceo-nigris. Long. $5\frac{1}{3}$ —6, lat. $3\frac{1}{3}$ —4 millim. — Brasilia.

Præcedenti valde affinis, interstitio 5 elytrorum brevioribus, marginis obtuse terminato, 2 ut in *Z. 9-striata* primo nonnihil latioribus.

16. *Z. novem-virgata*. — Ovalis, obscure ænea; capite, pedibus antennisque (clava fusca excepta) piceis; thoracis marginibus lateralibus et antico utrinque elytris flavis, his valde distincte punctatis, sutura, margine inflexo, limbo ipso, interstitiisque 1, 3, 5 (reliquis brevioribus) et 7 nigro-violaceis. Long. 7, lat. 4 millim. — America interior.
17. *Z. novem-lorata*. — Ovalis, rufo-picea, subtus æneo-micans; thoracis marginibus lateralibus et antico trisinuato elytris flavis, his valde distincte punctatis, sutura, limbo ipso interstitiisque 1, 3, 5 (reliquis brevioribus) et 7 nigris margine inflexo posterius testaceo. Long. $6\frac{1}{2}$ —7, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
18. *Z. multiviva*. — Ovalis, testacea, pedibus, antennis basin versus maculis 2 capitis, thoraceque flavo-testaceis, hujus litura ut littera M formata maculaque utrinque laterali cum illa conjuncta fortiter punctata, elytrorum flavescentium sutura, limbo ipso, interstitiisque 1, 3, 5 et 7 (3 et 5 apice conjunctis) testaceis. Long. 6, lat. $3\frac{2}{3}$ millim. — Bolivia.
19. *Z. rivulosa*. — Ovalis, subtus piceo-nigra, pedibus fusco-piceis, thorace rufo-piceo; antennis nigris, basin versus testaceo-flavis; elytris flavis, sutura, interstitiis 1, 3, 5, et 7 (1 et 7 æquilongis, 5 illis nonnihil brevioribus, 3 hoc adhuc brevioribus), linea se-

riem punctorum nonam occupante margineque inflexo nigris. Long. $6\frac{1}{2}$ —8, lat. 4—5. — Brasilia.

20. *Z. Virgo*. — Ovalis, supra aureo-flavescentis, subtus obscure aenea; pedibus, antennis basin versus, maculis 2 transversis thoracis ut ∞ formatis extus fortiter punctatis testaceis; scutello, elytrorum sutura, interstitiis 1, 3, 5 et 7 (1 et 2 æquilongis, 5 illis nonnihil brevioribus, 3 hoc adhuc brevioribus) limboque ipso picco-nigris. Long. 5, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — Bahía.

C. Elytris flavis, striato-punctatis, nigro-lineatis.

21. *Z. deleta*. — Ovalis, testacea, maculis 4 parvis capitis, thorace (exceptis maculis 4) elytrisque flavis, horum seriebus punctorum 1—8 nigro-lineatis. Long. $5\frac{1}{3}$ —7, lat. 4— $4\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.

COSMOGRAMMA. ER.

1. *C. patricia*. ER.
2. *C. fulvo-cincta*. — Nigra; elytris intra marginem seriebus 2 distinctis, suturam versus seriebus nonnullis minus distinctis punctorum, utriusque vittis 2, (una intramarginali) apice confluentibus limboque basali inter vittas fulvis; antennis pedibusque rufo-picceis. Long. 7, lat. 5 millim. — Brasilia.
3. *C. decora*. — Nigra, thorace utrimque fortiter punctato; elytris obscure brunneis, lineis 2 (una intramarginali) apice confluentibus, basi per lineam transversam connexis aureis. Long. 7—8, lat. 5—6 millim. — Brasilia.

DESMOGRAMMA. ER.

I. Thorax undique punctatus. Prosternum longitrorsum elevatum. Elytra seriatim punctata. Articulus apicalis tarsorum simplex. Unguiculi distantes.

1. *D. polychordia*. ER.
2. *D. bivittata*. LJUNGH.
3. *D. conjugata*. — Picca, plus minus æneo-micans; elytris subregulariter seriatim punctatis, sæpius obscurioribus, vittis interstitiorum 2 (primo nonnihil latiore) et 8 apice conjunctis et productis limboque basali inter vittas flavescens. Long. 7—8, lat. 5— $5\frac{1}{2}$ millim. — Nova Granada, Veragua.
4. *D. livia*. GERM.
5. *D. bigaria* ER.
6. *D. Ljunghi*. — Ænea, antennis, ore pedibusque picceis; femoribus æneo-indutis; elytris striato-punctatis, interstitiis 2 et 8 apice coeuntibus et productis, nec non 4 brevioribus limboque basali flavis. Long. 7—8, lat. 5— $5\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.

II. Thorax parce, latera versus parum densius, fortiter punctatus. Elytra irregulariter subgeminato-seriatim punctata. Prosternum haud elevatum.

7. *D. grammopocila*. — Obscure ænea, supra subopaca interstitiis alternis elytrorum testaceis. Long. 9, lat. $6\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
8. *D. bis-bilineata*. — Obscure ænea, elytris fusco-brunneis, lineis interstitiorum 2 et 8 apice conjunctis limboque angusto basali inter lineas sordide flavis. Long. 9, lat. $6\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.

III. Thorax parce latera versus paullulum densius punctatus. Elytra striato-punctata vel punctato-striata, prosternum haud elevatum.

9. *D. striatipennis*. — Ænea, cupreo-violaceoque micans; elytris subpunctato-striatis, interstitiis convexiusculis, 2 et 8 apice coeuntibus limboque basali inter illa flavis. Long. 8, lat. $5\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
10. *D. quadri-tæniata*. — Ænea, supra fusco-ænea; elytris seriatim sat fortiter punctatis, interstitiis 2 et 8 flavo-vittatis. Long. 9, lat. $6\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.
11. *D. flavo-fimbriata*. — Obscure ænea, antennis, ore pedibusque dilute piceis; elytris nigris, remote striato-punctatis, margine inflexo, limbo, margine basali, interstitioque 2 flavis. Long. $5\frac{1}{2}$ —6, lat. 4— $4\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia.

IV. Thorax lævis. Elytra seriatim punctata. Prosternum haud elevatum.

12. *D. Redtenbacheri*. — Ænea, basi antennarum, ore pedibusque testaceis; elytro utroque vitta intramarginali, vitta media abbreviata interstitii primi fasciolaque obliqua nonnihil pone medium flavis. Long. $8\frac{1}{2}$, lat. 6 millim. — Brasilia.
13. *D. impuncticollis*. — Ænea, antennis basin versus, ore pedibusque testaceis; elytrorum vitta intramarginali, vitta interstitii primi brevi ante medium abrupta, limbo basali fasciaque obliqua pone medium flavis. Long. $8\frac{1}{2}$, lat. 6 millim. — Brasilia.
14. *D. circuita*. — Æneo-nigra; antennis, ore pedibusque testaceis; elytris nigris, interstitio 8 toto, dimidio basali interstitii 1, limbo basali inter illa interstitia fasciaque obliqua pone medium flavis. Long. 7, lat. 5 millim. — Brasilia.

CALLIGRAPHA. ER.

I. Articulo apicali tarsorum subtus dentato; unguiculis (basi saltem) contiguis.

1. *C. signatipennis*. — Suboblonga, ænea, elytris stramineis, vitta suturali, nec non utriusque limbo laterali (parte anteriore excepta) litura magna, prope humerum incipiente ultra medium retrorsum et introrsum ducta et ante medium cum vitta suturali ibidem

- dilatata conjuncta, maculisque circiter 6, una anteriore, 2 pone medium prope vittam suturalem et interdum cum hac conjunctis æneis. Long. 6—8, lat. 3—4 $\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.
2. *C. picicollis*. — Suboblonga, testaceo-pellucida, thorace testaceo, æneo-micante; elytris stramineis, vitta suturali, limbo laterali (parte anteriore excepta) nec non utriusque maculis liturisque compluribus, una humerali oblonga, postice emarginata, una mox pone medium arcuata, interdum cum vitta suturali conjuncta, majoribus, nec non tribus prope vittam suturalem una subbasali, una nonnihil pone illam, una prope apicem sæpius cum vitta confluyente, reliquis parvis, æneis. Long. 5 $\frac{1}{2}$ —7, lat. 3—4 millim. — Mexico.
 3. *C. dulcis*. — Ovalis, subtus ænea, capite, thorace, pedibusque testaceis, æneo-micantibus; elytris stramineis, limbo laterali (parte anteriore excepta), vitta suturali nec non utriusque maculis irregularibus 6 vel 7 sat magnis, una prope humerum incipiente arcuata, retrorsum et introrsum ducta, medio cum vitta suturali conjuncta, violaceo-æneis. Long. 5 $\frac{1}{2}$ —6, lat. 3—3 $\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.
 4. *C. amanda*. — Ovalis, ænea, thorace pedibusque sæpe testaceo-pellucidis; elytris stramineis, vitta suturali lata, vittisque utriusque 3 æneis. Long. 4—5, lat. 2 $\frac{1}{2}$ —3 millim. — Mexico.
 5. *C. lepidula*. — Ovalis, ænea, elytris stramineis, vitta suturali, maculisque compluribus minoribus æneis, vitta utriusque pallide testacea. Long. 4 $\frac{1}{2}$ —5, lat. 2 $\frac{2}{3}$ —3 millim. — Mexico.
 6. *C. guttaticollis*. — Brunneo-testacea, marginibus lateralibus maculisque 2 thoracis nec non elytris dilute flavescens, his nigro-multiguttulatis, vitta suturali vittaque utriusque abbreviata subarcuata testaceis. Long. 6—6 $\frac{1}{2}$, lat. 4 millim. — Mexico.
 7. *C. guttulosa*. — Ovalis, testacea, elytris dilute flavis, maculis numerosis parvis testaceis, æneo-micantibus, sparsis. Long. 5 $\frac{1}{3}$, lat. 3 $\frac{1}{2}$ millim. — Costa Rica.
 8. *C. Malva*. — Ovalis, obscure ænea, elytris flavis, vitta suturali nec non utriusque maculis nonnullis lituraque elongata, prope humerum incipiente, fissa, ramulum interiorem retrorsum et nonnihil introrsum ultra medium emittente æneo-nigris. Long. 6—7 $\frac{1}{3}$, lat. 4—5 millim. — Mexico.
 9. *C. bigenea*. — Ovalis, ænea, antennis pedibusque obscure testaceis, his æneo-micantibus; elytris stramineis, maculis nonnullis parvis, plaga suturali communi, medio latissima, ante medium utrimque ramulum, cum macula magna subhumerali conjunctum, emittente, æneis. Long. 7, lat. 5 millim. — Mexico.
 10. *C. magica*. — Ovalis, ænea, thorace pedibusque testaceo-pellucidis; elytris stramineis, vitta inæquali suturali nec non utriusque maculis parvis nonnullis lituraque magna, prope humerum inci-

piente, fere ad medium retrorsum et subintrorsum ducta, ibidem extrorsum arcuata, longius pone medium introrsum curvata et nonnihil retrorsum currente, saepe cum vitta suturali confluyente æneis. Long. 6, lat. 4 millim. — Mexico.

II. Unguiculis divaricatis.

1. Elytris flavis, æneo- vel testaceo-maculatis.

A. Elytris maculis 2 marginalibus vel submarginalibus æneis vel rubris, una nonnihil pone humerum, altera fere media.

11. *C. mexicana*. — Ænea, elytris flavescens, vitta communi suturali, antice trichotoma, nec non utriusque vitta arcuata ab humero retrorsum vix ad medium ducta, ibidem cum vitta alia suturæ approximata, longius posterius extrorsum flexa et producta, confluyente, maculisque circiter 10, inter has una prope basin, una pone medium, ante has 2 interdum confluentibus, postice 2 oblongis, apice interdum conjunctis. Long. 10—11, lat. 6—6½ millim. — Mexico.
12. *C. polypila*. GERM.
13. *C. matronalis*. ER.
14. *C. nupta*. — Ænea, antennis basin versus pedibusque rufo-testaceis; elytris stramineis, vitta suturali nec non utriusque maculis ex parte irregularibus circiter 10, saepius minoribus, variabilibus, una media majore, una elongata, prope humerum incipiente, retrorsum et introrsum ad medium ducta, æneis. Long. 7½—8, lat. 4½—5 millim. — Bogotà, Nova Granada.
15. *C. sponsa*. — Ænea, antennis basin versus pedibusque rufo-testaceis; elytris stramineis, vitta suturali nec non utriusque maculis circiter 9, una elongata, ab humero vix ad medium retrorsum et introrsum ducta, una mox pone medium, una pone hanc longius posterius majoribus, reliquis minoribus, ex parte sat minutis, sparsis, æneis. Long. 7½, lat. 4½ millim. — Nova Granada.
16. *C. fulvipes*. — Ænea, antennis basin versus pedibusque rufo-testaceis; elytris stramineis, vitta suturali, nec non utriusque maculis 11 vel ultra, plurimis parvis, sparsis, æneis, una inter has oblonga, ab humero retrorsum et introrsum ducta ante medium terminata, una subrotundata mox pone medium, majoribus. Long. 6½—8, lat. 4—5 millim. — Mexico.
17. *C. pantherina*. — Ænea, antennis basin versus pedibusque rufo-testaceis; elytris stramineis, vitta suturali maculisque numerosis, plurimis parvis sparsis, una humerali irregulari et una mox pone medium, majoribus, æneis. Long. 5½—8, lat. 4—5 millim. — Mexico.
18. — *C. tortilis*. — Rufo-testacea, elytris stramineis, vitta suturali utrimque subquadriramosa, nec non utriusque signaturis ex parte

confluentibus, una ab humero retrorsum et introrsum ad ramulum secundum vittæ suturalis ducta, una antice dichotoma discoidali pone medium, nec non maculis 4, inter has 2 inter vittam suturalem et signaturam humeralem, nigris. Long. 8, lat. 5 millim. — Costa Rica.

19. *C. Gyllenhalii*. — Flavescens, subtus eum pedibus, capite (maculis 2 magnis exceptis), maculis thoracis, scutello, elytrorum sutura nec non utriusque vitta angusta prope suturam, vitta arcuata ab humero retrorsum ultra medium ducta, vitta abbreviata inter vittam illam et subsuturalem, macula prope basin aliaque prope apicem ad vittam suturalem nec non macula una alterave minata, testacea. Long. 11, lat. 7 millim. — Mexico.
20. *C. limbaticollis*. — Testacea, marginibus lateralibus et antico thoracis, hoc a medio ramulum apice dichotomum retrorsum emittente elytrisque flavis, horum vitta suturali, maculis utriusque circiter 10 signaturaque elongata a basi ultra medium extensa, subarcuata, apice recurva, testaceis. Long. $7\frac{1}{2}$ —9, lat. $4\frac{2}{3}$ — $5\frac{1}{3}$ millim. — Mexico.

B. Elytris macula nulla vel unica marginali.

a. Elytris testaceo-notatis.

21. *C. labyrinthica*. — Testacea, elytris stramineis, vitta suturali pone medium utrinque biramosa, vitta utriusque arcuata, ab humero retrorsum et introrsum ad medium vittæ suturalis ducta et eum hac confluenta, maculis pluribus, una submarginali anteriore, 2 inter vittam humeralem et suturalem, 5 pone medium confluentibus, limboque pone medium testaceis. Long. $8\frac{1}{2}$, lat. $5\frac{1}{3}$ millim. — Mexico.
22. *C. notatipennis*. — Testacea, elytris stramineis, vitta suturali medio biramosa, nec non utriusque macula magna humerali apice dichotoma maculisque circiter 11, una anteriore submarginali, 2 inter maculam humeralem et vittam suturalem, 5 discoidalibus pone medium liberis, unaque prope apicem eum vitta suturali conjuncta testaceis. Long. 9, lat. $5\frac{2}{3}$ millim. — Mexico.
23. *C. Argus*. — Testacea, subænescenti-micans, elytris stramineis, vitta suturali utriusque quadriramulosa, nec non utriusque maculis circiter 13, una marginali media, una majore subhumerali postice dichotoma, una inter hanc et vittam suturalem, reliquis sparsis, testaceis. Long. 9, lat. $5\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.

b. Elytris æneo-notatis.

24. *C. diversa*. — Ænea, elytris stramineis, vitta suturali utrinque quadriramulosa, nec non utriusque maculis circiter 11, una subhumerali magna, postice introrsum nonnihil producta, una inter illam et vittam suturalem, reliquis sparsis, æneis, nulla marginali. Long. 9—10, Lat. 5— $6\frac{1}{3}$ millim. — Mexico.

25. *C. suboculata*. — *Ænea*, femoribus capiteque testaceo-pelluceidis; elytris sordide stramineis, vitta suturali subquadriramulosa nec non utriusque maculis compluribus æneis, una marginali fere media, una subelongata, humerali, postice introrsum ad ramulum secundum vittæ suturalis ducta, duabus inter maculam humeralem at vittam suturalem, reliquis sparsis. Long. 9, lat. $5\frac{2}{3}$ millim. — Mexico.
26. *C. multi-pustulata*. — *Ænea*, elytris sordide stramineis, vitta suturali utrinque quadriramulosa, nec non utriusque maculis circiter 16 ex parte confluentibus, una marginali media, una humerali majore, postice introrsum producta, una inter hanc et vittam suturalem, reliquis sparsis, æneis. Long. $10\frac{1}{2}$, lat. $6\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.
27. *C. ramulifera*. — *Ænea*, elytris stramineis, vitta suturali utrinque quadriramulosa, nec non utriusque maculis fere omnibus minutis, æneis, pallido-einctis, inter has una marginali media, una majore subhumerali, una inter hanc et vittam, suturalem, reliquis sparsis. Long. $8\frac{1}{2}$, lat. $5\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.
28. *C. aneo-picta*. — *Ænea*, elytris stramineis, vitta suturali utrinque quadrisubramosa, nec non utriusque macula majore subhumerali, æneis. Long. $7\frac{3}{4}$ — $8\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{2}{3}$ — $5\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.
29. *C. arcuigera*. — *Ænea*, antennis pedibusque testaceis; elytris sordide flavescentibus, vitta suturali simpliciter nec non utriusque signaturis ex parte semicircularibus, anterioribus confluentibus maculaque marginali media æneis. Long. 8, lat. 5 millim. — Bolivia.
30. *C. decem-guttata*. — *Ænescente-nigra*; elytris stramineis, vitta suturali nec non utriusque maculis 5 (2. 2. 1) anescente-nigris. Long. 8, lat. 5 millim. — Brasilia.
31. *C. fracta*. — *Ænea*, elytris flavis, vitta suturali nec non utriusque vittis 3, media apicem versus dilatata, exteriori pone medium abbreviata, chalybeo-æneis. Long. 7, lat. 4 millim. — Columbia.
32. *C. consors*. — Chalybeo-ænea; elytris testaceis vel luteis, vitta suturali nec non utriusque vittis 3, media apice dilatata, exteriori abbreviata chalybeo-æneis. Long. 7, lat. 4 millim. — Lima.
33. *C. aneo-vittata*. — *Ænea*, elytris flavescentibus, vitta suturali nec non utriusque vittis 3 æneis, media inferiore breviori, subcurva, exteriori interrupta. Long. $6\frac{1}{3}$, lat. 4 millim. — Mexico.
34. *C. curvilinea*. — *Ænea*, elytris flavescentibus, vitta suturali antice trichotoma, nec non utriusque vittis una anteriore, una exteriori, ante medium abbreviata, una ad humerum incipiente retrorsum ad medium vittæ exterioris ducta et ibidem cum hac confluenta maculisque 2, una pone humerum, altera discoidali, nonnihil pone medium, æneis. Long. 7, lat. $3\frac{2}{3}$ millim. — Perù

35. *C. quinque-virgata*. — Ænescente-nigra, elytris flavis, vittis 5, media suturali communi, limboque pone medium æneo-nigris. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.
2. Elytris æneis vel nigris, flavo-maculatis.
36. *C. 20-maculata*. CHEVR.
37. *C. stillatipennis*. — Nigra, elytris maculis circiter 24—26, minoribus flavis ornatis. Long. lat. 6 millim. — Mexico.
38. *C. morbida*. — Ænea, antennis pedibusque testaceis; elytris maculis numerosis flavis acervatis, spatio transverso prope basin regioneque angusta suturali impictis. Long. 6— $8\frac{1}{2}$, lat. 4— $5\frac{1}{2}$ millim. — Mexico.
39. *C. multi-guttata*. — Ænea, elytris limbo (medio macula parva ænea notato) maculisque compluribus majusculis flavis, æneo-punctatis. Long. $5\frac{1}{2}$, lat. $3\frac{3}{4}$ millim. — Mexico.
-